

NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ) ANABİLİM DALI

1. Soru: 7 yaşındaki oğlum üst ön dişini kaybetti. Şimdi alt dişi sallanıyor. Ve o bölgenin ağrıdığını söylemekte. Ben süt dişlerinin arkasından daimi dişlerinin geldiğini görüyorum fakat daimi dişlerden biri sallanıyor. Bu durum normal midir? 5 yaşındayken röntgenini çeken hekim her şeyin normal olduğunu söyledi. Ve temizlik ile örtücü dışında herhangi bir tedavi uygulamadı.

Dokuların gelişimini bir periodontistin görmesinde fayda vardır. Süt dişleri düşmeden daimiler süt dişlerinin önünden yada yanından sürebilir ve süt dişleri düşmeden ağızda kalabilir. Daimi dişi ağızda korumak gerekmektedir.

2. Soru: 3 yaşındaki oğlumun ön 2 dişinin köklerinde iltihap var. Ayrıca üst dişetlerinde yara var. Çocuk diş hekimi dişin çekilmesi gerektiğini söylemektedir. İkinci bir görüş için başka bir hekime götürdük. O da bu yaşta travmatize olacağı için çekirtmememizi söyledi. Röntgende koyu bir alan görülmektedir. Çocuk diş hekimi bu iltihabın daimi dişleri etkileyebileceğini söyledi. Öneriniz nedir?

Bir pedodontist genel diş hekimine göre daha geniş açıdan bakabilir. Ayrıca sedasyon travma oluşturan bir olay değildir. Ayrıca süt dişlerindeki iltihaplar daimi dişlerin gelişimini etkilemektedir.

3. Soru: Üç hafta önce 3 yaşındaki kızım ağızını pencere kenarına vurdu. Üst sol taraf diyeti yırtıldı. Dişin kökü etkilendi ve kötü görünmekte. Bugün bir periodontiste götürdüm. Bir ay sonra tekrar görmek istedi ve dişin iyileşebileceğini söyledi. Diş eti için bir öneri istedim. Bu yaşta bir şey yapmaya gerek olmadığını söyledi. Bu gerçekten doğru mu?

Aslında olay sırasında kaybolan doku büyük bir miktarda olmadığı sürece, herhangi bir uygulama gerekmemektedir. Eğer ileride gerekirse bir uygulama yapılabilir. 2-3 yıl sonra diş kaybedilebilir ve daimi diş sürerken dokular yenilenebilir.

4. Soru: 7 yaşındaki torunum uykusunda dişlerini gıcırdatmaktadır. Bunu önlemek için ne yapabilirim? Bir diş hekimine götürmek gerekir mi?

Çocuklarda diş gıcırdatma çok yaygındır. Hastaların %40-60'ının dişlerinde aşınma mevcuttur. Eğer daimi dişler sürdükten sonra aşınma devam ederse gece plağı önerilmektedir. Bu alışkanlık genellikle 8 yaşında sona ermektedir. Eğer sona ermezse gece plağı yapılır. Aşınmanın şiddetinden emin olmak için çocuk diş hekimine muayene olması önerilir.

5. Soru: Çocuğu diş hekimine götürmek için en ideal yaş kaçtır?

3 yaşında çocuğunuzu diş hekimine götürebilirsiniz. Bu ziyarette, radyografik muayene, florür tedavisi uygulamak ve klinik muayene yapılır.